

P193. Current state of gestational diabetes (dg) in our maternity. Corrientes. Argentina. 2017

A Elizalde Cremonte (AR) [1], J M Romero Benitez (AR) [2], S A Elizalde Cremonte (AR) [3], D A Vidal (AR) [4]

CONTEXTO: La prevalencia de DG en el mundo oscila entre 2 a 9%. En Argentina es del 5%. Nuestra Maternidad, recibe al 50% de la población de embarazadas de la Ciudad, la prevalencia en el año 2013, fue de 3.1 %, actualmente se ha modificado a 3.8% en 10 meses evaluados. Consideramos nuestra prevalencia superior a la total del país, por lo que nos interesa reevaluar los factores predisponentes. **OBJETIVOS:** 1) Confirmar la prevalencia de DG en nuestra Maternidad. 2) Reevaluar variables epidemiológicas y factores de riesgo asociados. **PACIENTES Y MÉTODOS:** Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal basado en 1.853 historias clínicas perinatales. Período de 01/01/17 al 31/10/17. Muestra: 72 historias clínicas perinatales de embarazadas con DG. Variables de estudio: edad, raza, escolaridad, procedencia, estado civil, antecedentes de DM en familiares de 1º, IMC, gestas, antecedentes de macrosomía, sexo del RN, apgar, internación conjunta y malformaciones congénitas. Criterio de exclusión: DBT Pregestacional. **INTERVENCIÓN:** variables categóricas expresadas en porcentaje, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Programa Estadístico EpiInfo versión 7. **PRINCIPALES RESULTADOS:** La prevalencia de DBT gestacional es de 3,8 % (n=72). Edad media fue de 29,8 D/S $\pm$ 6,84. Raza: Blanca: 87,5%; Mestiza 12,5%. Domicilio: Capital 73,6%; Interior: 26,3%. Escolaridad: primaria: 40,2%; secundaria: 45,8%; universitario: 13,8%. Estados civil: soltera 19,4%; casada 16,6%; unión estable 63,8%. Gestas: multíparas 70,8%; nulíparas 29,1%. Antecedentes familiares: presente 41,6%; ausente 58,3%. Antecedentes obstétricos: presente 26,3%; ausente 73,6%. IMC: normopeso 23,6%; sobrepeso 36,1%; obesidad 40,2%. Peso del RN: bajo peso 11,1%; peso adecuado 61,1%; alto peso 30,5%. Apgar: deprimido 5,5% (leve 1,3%; moderado 1,35%; grave: 2,7%); vigoroso 91,6%; Feto muerto 2,7%. Sexo: masculino 51,3%; femenino 50%. Internación conjunta madre/hijo: si 84,7%; no 15,2%. Malformaciones congénitas: presentes 9,7%; ausentes 90,2%. **CONCLUSIONES:** Nuestra prevalencia de DG no coincide con la bibliografía consultada: 4.6% anual para Argentina, 3.8 % en sólo 10 meses para nuestra Maternidad, y se encuentra en ascenso. Destacamos la procedencia urbana de estas gestantes. Principales factores de riesgo: obesidad, sobrepeso, macrosomías fetales, multiparidad. Son espejo de lo ya hallado, por lo cual debemos reforzar el trabajo que se está llevando a cabo.

[1] Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Ciudad de Corrientes,, [2] Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Ciudad de Corrientes,, [3] Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Ciudad de Corrientes,, [4] Hospital Ángela Llano, Departamento de Perinatología. Corrientes